



**ESTADOS FENOLÓGICOS**



**BARBECHO QUÍMICO**



**SIEMBRA**



**ESTADO VEGETATIVO**



**ESTADO REPRODUCTIVO**

**Bioamino-L<sup>®</sup>**  
MITIGADOR DE FITOTOXICIDAD

**3 L/ha**  
(aplicar desde 30 días antes de la siembra junto con herbicidas)

**Bioamino-L<sup>®</sup>**  
TRATAMIENTOS DE SEMILLAS

**300 cc/ 100 kg de semillas**  
(junto con terapéuticos e inoculantes)

**Aminoterra<sup>®</sup>**  
FOLIAR  
BIOESTIMULANTE ANTIESTRÉS

**1 - 2 L/ha**  
(con herbicidas e insecticidas)

**1 - 2 L/ha**  
(con fungicidas e insecticidas)

**Bioil-5(Enhance)<sup>®</sup>**  
ACEITE NATURAL DE USO AGRÍCOLA

**0,5 - 1%**  
(aplicar junto con herbicidas)

**0,5 - 1%**  
(con herbicidas e insecticidas)

**0,5 - 1%**  
(con fungicidas e insecticidas)

# Resultados de ensayos

**Efecto de Bioamino-L** como tratamiento de semilla sobre el rendimiento **en cultivo de soya**. Argentina, temporada 2018/19. (Fuente Margarita Sillón, Universidad Nacional del Litoral)

